


ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL

Dr. Santiago Gutiérrez García





¿QUÉ SON ?




❖ Las enfermedades de transmisión sexual (ETS) son infecciones que se adquieren por tener relaciones sexuales con alguien que esté infectado. Las causas de las ETS son las bacterias, parásitos y virus.



¿Cuáles son?




**¿CÓMO SE
TRANSMITEN?**



❖ La mayoría de las ETS afectan tanto a hombres como a mujeres, pero en muchos casos los problemas de salud que provocan pueden ser más graves en las mujeres. Si una mujer embarazada padece de ETS, puede causarle graves problemas de salud al bebé.

CLAMIDIA


- ❖ causada por una bacteria
- ❖ puede contraer clamidia durante el sexo oral, vaginal o anal con una persona infectada.
- ❖ Tanto los hombres como las mujeres pueden tenerla.
- ❖ La clamidia no suele causar síntomas. Pero cuando sí se presentan, pueden aparecer como una sensación de ardor al orinar o una secreción anormal por la vagina o el pene.

- 
-
- ❖ puede conducir a infertilidad o problemas serios con el embarazo
 - ❖ puede provocar una infección urinaria tanto en hombres como en mujeres
 - ❖ Los niños que nacen de madres infectadas pueden tener infecciones oculares y neumonía por clamidia
 - ❖ Puede causar infertilidad



GONORREA

- ❖ Es más común en los adultos jóvenes.
- ❖ puede infectar el tracto genital, la boca o el ano.
- ❖ Una mujer embarazada puede transmitírsela a su bebé durante el parto.
- ❖ Algunas veces, la gonorrea no provoca síntomas
- ❖ De no tratarse puede causar infertilidad.




❖ En los hombres, la gonorrea puede causar dolor al orinar y secreción proveniente del pene. De no tratarse, puede causar problemas en la próstata y testículos.


❖ En las mujeres, los primeros síntomas de gonorrea generalmente son leves. A medida que pasa el tiempo, puede provocar hemorragias entre los períodos menstruales, dolor al orinar y aumento de las secreciones vaginales



HERPES GENITAL

- ❖ causada por el virus del herpes simple
- ❖ Puede causar llagas en el área genital o rectal, nalgas y muslos.
- ❖ Se puede contagiar al tener relaciones sexuales, incluso sexo oral.
- ❖ El virus puede contagiarse aún cuando las llagas no están presentes.
- ❖ . Las madres pueden infectar a sus bebés durante el parto.

- 
-
- ❖ Pueden aparecer llagas cerca del área donde el virus ingresó al cuerpo. Se convierten en ampollas que pican y duelen y luego sanan
 - ❖ A veces las personas no saben que tienen herpes porque no presentan síntomas o éstos son muy leves
 - ❖ El virus puede ser más grave en recién nacidos o en personas con un sistema inmune debilitado.



❖. El virus permanece en su cuerpo para siempre.



VIH/SIDA

❖ **V**: virus

❖ **S**: síndrome

❖ **I**: inmunodeficiencia

❖ **I**: inmuno

adquirida

❖ **D**: deficiencia

❖ **H**: humana


❖ **A**: Adquirida

El VIH es un virus que mata o daña las células del sistema inmunológico del organismo



COMO SE CONTAGIA


- ❖ relaciones sexuales sin protección con una persona infectada.
- ❖ compartir agujas con drogas o mediante el contacto con la sangre de una persona infectada.
- ❖ Las mujeres pueden transmitírselo a sus bebés durante el embarazo o el parto.



❖ Los primeros signos de infección con VIH pueden ser inflamación de los ganglios y síntomas gripales.

❖ Los mismos pueden presentarse y desaparecer un mes o dos después de la infección.

❖ Los síntomas graves pueden no aparecer hasta pasados meses o años.





- 
-
- ❖ **No existe una cura**
 - ❖ **Existen medicinas para combatir la infección y cánceres que lo acompañan**
 - ❖ **Las personas pueden vivir con la enfermedad muchos años.**



VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO


- ❖ son virus comunes que pueden causar verrugas.
- ❖ Existen más de 100 tipos de VPH. La mayoría son inofensivos, pero aproximadamente 30 tipos se asocian con un mayor riesgo de tener cáncer.
- ❖ Los VPH de bajo riesgo pueden causar verrugas genitales.
- ❖ los VPH de alto riesgo pueden conducir al cáncer del cuello uterino, vulva, vagina y ano. En los hombres, pueden conducir al cáncer del ano y del pene.





SIFILIS

- ❖ Infecta el área genital, los labios, la boca o el ano y afecta tanto a los hombres como a las mujeres
- ❖ Por lo general se adquiere por contacto sexual con una persona que la tiene.
- ❖ También puede pasar de la madre al bebé durante el embarazo.









TRICOMONIASIS


- ❖ causada por un parásito.
- ❖ Afecta tanto a los hombres, como a las mujeres, pero los síntomas son más comunes entre las mujeres.
- ❖ Los síntomas entre las mujeres incluyen una secreción vaginal verdosa o amarillenta, picazón en la vagina o cerca de ésta y molestias para orinar.
- ❖ La mayoría de los hombres con tricomoniasis no presenta síntomas, pero pueden tener irritación dentro del pene.

- 
-
- ❖ La infección por tricomonas puede curarse con antibióticos.
 - ❖ Entre los hombres, la infección suele desaparecer espontáneamente sin provocar síntomas.
 - ❖ Pero un hombre infectado puede continuar infectando o reinfectando a una mujer hasta que reciba tratamiento

Tricomoniasis




Tricomoniasis (Tricomoniasis Vaginal)




▲ = Estadio infeccioso
▲ = Diagnóstico de estadio

Tricomona Vaginal

1. Trofozoitos en las secreciones vaginales, próstata y de orina
2. Multiplica longitudinal por fisión binaria
3. Trofozoite o Vagina Orificio de la uretra



EN RESUMEN





VIDEO!!!